MANUEL BARRETO

by UNITRI Press

Submission date: 26-Feb-2024 10:06PM (UTC-0600)

Submission ID: 2305669445

File name: MANUEL_BARRETO.docx (112.01K)

Word count: 1378 Character count: 8558

RESPON TOMAT TERHADAP PUPUK BOKASHI DAN JENIS URIN TERNAK KELINCI, KAMBING DAN SAPI

SKRIPSI



OLEH:

MANUEL BARRETO 2017330039

PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI FAKULTS PERTANIAN UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI MALANG 2023

RINGKASAN

Pemilihan pupuk atau sumber unsur hara yang tepat merupakan salah satu cara untuk mendongkrak produksi tomat. Memilih pupuk yang tepat sangat penting untuk menghasilkan tomat tanpa merusak tanah. Oleh karena itu, penggunaan urin hewan dengan bokashi merupakan pendekatan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dalam menerapkan teknologi pertanian organik. Mengetahui jenis kencing apa saja yang tersedia, bagaimana bokashi dan urin berinteraksi dengan tomat, dan bagaimana respon tomat terhadap pupuk bokashi menjadi tujuan utama penelitian ini.

Jenis urin hewan dan komponen bokasi merupakan dua parameter yang termasuk dalam rancangan percobaan Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang digunakan dalam penelitian ini. Faktor Bokasih ada tiga taraf: B1 (300 g/polibag), B2 (600 g/polibag), dan B3 (900 g/polibag). Urine kambing, sapi, dan kelinci merupakan contoh urin hewan. Pengukuran yang dilakukan dalam pengamatan adalah hasil tomat, tinggi tanaman, diameter batang, diameter buah/tanaman, bobot/tanaman, jumlah bunga/tanaman, dan jumlah buah/tanaman. Uji BNJ 5% digunakan setelah analisis varians pada data penelitian untuk memverifikasi apakah benar terdapat dampak.

Berdasarkan temuan penelitian, terapi dosis Bokasih tidak memiliki dampak nyata terhadap variabel yang diteliti. Tidak ada perubahan nyata yang terlihat pada parameter yang dinilai dengan perlakuan dosis pupuk organik cair (POC). Metrik penilaian menunjukkan tidak ada interaksi yang signifikan antara perbedaan dosis Bokasih dan penggunaan pupuk organik cair (POC). Temuan yang diamati pada kambing dan sapi dengan dosis POC yang sama sama dengan temuan pada kelinci.

Kata Kunci: Tomat, Pupuk Bokasih, Urin Ternak Kelinci, Kambing dan Sapi

I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Tomat, *Solanum lycopersicum L.*, merupakan salah satu produk pertanian padat nutrisi karena kandungan mineral dan vitaminnya yang tinggi. Menurut Sahetapy (2017), tomat tinggi karbohidrat, lemak, protein, dan kalori. Selain vitamin A, B, dan C serta zat gizi makro lainnya, tomat juga mengandung sejumlah besar mineral penting (Canene-Adam et al., 2004; Nasir et al., 2015; Surbakti & Berawi, 2016). Oleh karena itu, keinginan untuk makan lebih banyak harus meningkat sebanding dengan jumlah peserta dan tingkat pengetahuan masyarakat agar dapat memberikan manfaat bagi kesehatan masyarakat (Ndolu & Puling, 2022).

Panen tomat Indonesia pada tahun 2011 dan 2013 berbeda. Hidayatul, Islami, dan Maghfoer (2018) mengutip BPS (2013) yang menyatakan bahwa produksi tomat mencapai puncaknya pada tahun 2011 sebesar 954.046 ton, menurun menjadi 893.504 ton pada tahun 2012, dan kemudian kembali meningkat menjadi 893.504 ton pada tahun 2012. Pencapaian tersebut mencapai 992.780 ton pada tahun 2013. Panen tomat pada tahun 2021 melampaui tahun 2020 sebesar 1.114.399 ton, menurut data Badan Pusat Statistik tanaman hortikultura. Pada tahun 2020 terdapat 1.084.993 ton tomat yang diproduksi secara keseluruhan. Dinas Pertanian Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki data yang menunjukkan bahwa banyak lokasi lain yang juga menghasilkan tomat. Statistik Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sikka tahun 2017 menunjukkan, misalnya, pada tahun 2018, 96 ha tanaman tomat di panen dan 17.330 kuintal produk tomat dihasilkan setiap tahunnya; Pada tahun 2019, tanaman tomat telah dipanen seluas 75 ha dan total produksi yang dihasilkan mencapai 8.036 kuintal. Angka-angka tersebut menunjukkan produksi tomat di Kabupaten Sikka mengalami penurunan. Rendahnya hasil panen disebabkan oleh teknik budidaya tomat yang di bawah standar, seperti penggunaan pupuk yang di bawah standar. Karena bahan organik dapat melemahkan struktur tanah, akar tanaman akan mampu menyaring tanah dan menyerap unsur hara dengan lebih mudah. Hal ini akan mendorong pertumbuhan dan perkembangan tanaman, sehingga meningkatkan hasil dan kualitas tomat yang dihasilkan (Fitriani, 2019). Penggunaan pupuk yang diperoleh dari pucuk daun merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mendongkrak produksi tomat. Agar organisme tanah dan akar tanaman dapat tumbuh subur dan menghasilkan sumber nutrisi yang sehat bagi tanaman, struktur tanah harus diperbaiki. Bokashi, bahan organik, membantu proses ini. Tanaman membutuhkan waktu lebih lama untuk mendapatkan unsur hara dari bokashi padat dibandingkan dengan pupuk organik cair. Hasilnya, pupuk menyediakan sumber nutrisi tambahan. Penting untuk diingat bahwa produk limbah padat dari bahan

organik cair menyediakan semua nutrisi bagi tanaman. Dalam metode pertanian organik yang sadar ekologi dan berkelanjutan, kotoran ayam digunakan sebagai pengganti ayam sebenarnya.

Kotoran ayam memiliki nilai gizi yang tinggi sehingga cocok dijadikan sebagai pupuk organik. Berbeda dengan bokashi kotoran kambing, sapi, dan kuda, hasil tomat dapat ditingkatkan dengan menggabungkan pupuk bokashi kotoran ayam dengan setengah dosis pupuk yang diperlukan, berdasarkan penelitian tentang penggunaan bokashi kotoran ayam oleh Pangaribuan dkk. (2012). Bokashi terbaik jika dibuat dari kotoran hewan adalah yang terbuat dari kotoran ayam. Penggunaan pupuk bokashi yang berbahan dasar kotoran ayam diyakini dapat meningkatkan kegiatan pertanian sekaligus mengatasi ketersediaan dan mahalnya harga pupuk kimia (anorganik). Selain mengeraskan tanah dan menurunkan kapasitasnya dalam menyimpan udara dan unsur hara, penambahan mineral pada pupuk anorganik dapat membunuh mikroba perusak tanah, klaim Mulyani (2014). Dampak buruknya terhadap tanah dan ekosistem dapat dikurangi dengan mengganti pupuk anorganik dengan pupuk organik yang lebih ramah lingkungan. Hasibuan (2015) menyatakan bahwa berbagai karakteristik kimia dan fisik tanah, seperti pH dan bahan organik, dapat diperbaiki dengan pemberian pupuk organik. Bokashi adalah pupuk organik yang mendorong pertumbuhan tanaman. Hal ini mendukung penelitian Tufaila dkk. (2014) yang melaporkan peningkatan produksi tanaman mentimun di tanah masam dengan pemberian bokashi atau kotoran ayam. Selain itu, penggunaan pupuk bokashi, yang berasal dari kotoran ayam, dapat meningkatkan hasil panen tomat, menjaga keseimbangan udara dan air tanah, mendorong pertumbuhan akar yang kuat, dan meningkatkan penyerapan nitrogen.

Gunakan jenis pupuk yang lebih baik dan sesuai dengan ekosistem lokal pada tanah, seperti pupuk bokashi yang terbuat dari kotoran ayam. Varietas Rempai mengungguli jenis tanaman tomat Vida dan Super King dalam hal pertumbuhan dan hasil, menurut penelitian yang dipublikasikan pada tahun 2013 oleh Abiddin dkk. Selain itu, kotoran unggas merupakan sumber nutrisi utama bagi tanaman hortikultura. Kotoran ayam biasanya mengandung 55% H2 O, 1,00% N, 0,80% P2 O5, dan 0,04% K2 O, menurut penelitian Hasibuan (2004). Kandungan fosfor dan nitrogen lebih tinggi pada kotoran ayam. Selain bokasih, tomat yang diproduksi juga lebih banyak. Penggunaan pupuk cair organik menjadi tujuan utama perusahaan. Pupuk organik cair merupakan salah satu bentuk pupuk organik yang banyak dijumpai di pasaran. Hadisuwito (2010) mendefinisikan pupuk organik cair sebagai campuran bahan organik padat yang mudah larut dari kotoran tumbuhan, hewan, dan manusia yang dikombinasikan dengan satu atau lebih unsur pembawa yang dibutuhkan tanaman. Dari segi penerapan di lapangan dan transportasi yang efisien, pupuk organik cair lebih unggul dibandingkan pupuk padat dan cair. Karena ketersediaannya yang mudah dan biaya yang lebih rendah, banyak petani tomat yang beralih dari pupuk organik cair ke pupuk organik alami. Salah satu jenis pupuk organik cair yang banyak digunakan saat ini adalah urin kambing, kelinci, dan sapi.

Penggunaan pupuk kandang merupakan salah satu cara untuk mencegah kerusakan tanah yang disebabkan oleh jarangnya penggunaan pupuk anorganik. Selain itu, penelitian yang dilakukan pada tahun 2005 oleh Dinas Peternakan dan dipublikasikan di Marpaung et al. (2014) menyatakan bahwa kotoran dan urin kelinci dapat digunakan sebagai insektisida dan pupuk bagi tanaman. Urine kambing telah dibuktikan oleh Sitorus dkk. (2015) mengandung sejumlah besar nitrogen dan kalium selain hormon yang mendorong perkembangan tanaman. Hal ini menjadikannya pilihan yang sangat baik untuk digunakan sebagai pupuk organik cair yang kaya nutrisi bagi tanaman.

Sejumlah penelitian mendukung manfaat penggunaan urin sapi untuk tanaman. Pemberian bibit kelapa sawit di persemaian utama konsentrasi urin sapi 5% meningkatkan jumlah pelepah kelapa sawit, berat kering, dan serapan mineral N, P, K, Ca, dan Mg. Syarovy & rekan (2015). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sarah et al., (2016) tanaman yang mendapat pupuk organik cair dari fermentasi urin kambing dengan konsentrasi 200 ml/l menunjukkan jumlah perkembangan vegetatif tertinggi. Para peneliti bertujuan untuk mengetahui pengaruh pupuk bokasi dan jenis urin sapi lainnya pada tomat dengan menggunakan beragam sumber informasi.

I.2 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah

- 1. Mengetahui reaksi tomat ketika diberi pupuk bokasih.
- 2. Mengetahui bagaimana reaksi tomat terhadap berbagai jenis kencing.
- 3. Menyelidiki hubungan antara urine sapi pada tomat dan belalang.

I.3 Manfaat

- Berikan rincian bagaimana reaksi tanaman tomat terhadap pupuk berbahan bokasih.
- 2. Cantumkan rincian bagaimana tanaman tomat bereaksi terhadap POC.
- Menyertakan secara detail bagaimana POC dan bokasih berinteraksi dengan tanaman tomat.

I.4 Hipotesis

Berdasarkan premis penelitian, reaksi tomat berbeda terhadap berbagai jenis urin sapi dan pupuk bokasih.

- 1. Diduga bahwa ada respon tanaman tomat terhadap pupuk bokasih.
- 2. Diduga bahwa ada respon tanaman tomat terhadap pemberian POC
- Diduga bahwa ada interaksi antara bokasih dan POC terhadap tanaman tomat.

MANUEL BARRETO

ORIGINALITY REPORT							
SIMILA	3% RITY INDEX	11% INTERNET SOURCES	5% PUBLICATIONS	3% STUDENT PAPERS			
PRIMARY	SOURCES						
1	eprints.u	umm.ac.id		2%			
2	scholar.u	unand.ac.id		1 %			
3	digilib.ui	nsby.ac.id		1 %			
4	Junaidi Junaidi, Bambang Dwi Moeljanto. "USAHA PENINGKATAN PRODUKSI TOMAT (Lycopersicum esculentum Mill) DENGAN PUPUK ORGANIK CAIR (POC)", Jurnal Agrinika : Jurnal Agroteknologi dan Agribisnis, 2019 Publication						
5	journal.p	ooltekkes-mks.a	c.id	1 %			
6	jurnal.ur			1 %			
7	Adhi Sur ORGANI	hya Anggraeny, ya Perdana. "Ko K CAIR (POC) N I TERHADAP H <i>A</i>	ONSENTRASI ASA DAN TEK	PUPUK NIK			

MENTIMUN (Cucumis sativus L.)", LUMBUNG, 2020

Publication

8	www.bugarfit.com Internet Source	1%
9	www.scribd.com Internet Source	1 %
10	yuanitawahyu.blogspot.com Internet Source	1 %
11	Akari Edy, Resti Puspa Kartika Sari, Hidayat Pujisiswanto. "PENGARUH DOSIS PUPUK ORGANIK BIO-SLURRY CAIR DAN WAKTU APLIKASI TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN JAGUNG (Zea mays L.)", JURNAL AGROTROPIKA, 2021	1%
12	brosurharga.web.id Internet Source	1%
13	disdikkbb.org Internet Source	1%
14	fungsional.pertanian.go.id Internet Source	1%
15	id.scribd.com Internet Source	1%
16	Nindi Andianingsih, Arrin Rosmala, Syariful Mubarok. "Pengaruh Pemberian Hormon	<1%

Auksin dan Giberelin terhadap Pertumbuhan Tomat (Solanum lycopersicum L.) Var. Aichi First", AGROSCRIPT: Journal of Applied Agricultural Sciences, 2021

Publication



repository.usd.ac.id

Internet Source

<1%

Exclude quotes On

Exclude matches

Exclude bibliography On

Off

MANUEL BARRETO

PAGE 1		
PAGE 2		
PAGE 3		
PAGE 4		
PAGE 5		